

Arboretum Heempark Delft




Kaart Arboretum-Heempark Noord



Kaart Arboretum-Heempark Zuid



1 Het heemstweitje



hoefblad
waterlelie
gele plomp

	1	2	3	4	5
01					
Aantal	3	1	3	9	1
Nederlandse naam	Waterwilg	Spaanse aak	Bittere wilg	Schietwilg	Veldiep
Wetenschappelijke naam	Salix caprea	Acer campestre	Salix purpurea (Amplexicaulus)	Salix alba	Ulmus minor
Familie naam	Wilgen	Esdoorn	Wilgen	Wilgen	Iepen
In Europa sinds	lang in cultuur	lang in cultuur	1904	lang in cultuur	lang in cultuur
Oorsprong	Europa en Noord-Azië	Europa en West-Azië	Duitsland	Europa, Noord-Azië en Middellandse Zee (Knotwilg)	Europa
Bloeitijd	mrt apr	mei	mrt apr	mei	feb mrt
01					
Aantal					
Nederlandse naam	Liguster	Krentenboompje	Gelderse Roos		
Wetenschappelijke naam			Viburnum opulus		
Familie naam			Kamperfoelie		
In Europa sinds			lang in cultuur		
Oorsprong			Europa, Noord-Azië en Middellandse Zee		
Bloeitijd			mei jun		


2 Het hazelaarbosje



korenbloem
 klaproos
 bolderik
 gele ganzebloem
 wilde klaproos of papaver,
 akkervergeet-me-niet-je
 herik
 soorten wikke
 hennepnetel
 spiegelklokje

02	1	2	3	4	5	6
Aantal	1	1	1	5	1	1
Nederlandse naam		Wegedoorn	Gewone vuilboom	Gewone hazelaar	Gewone es	
Wetenschappelijke naam	Populus lasiocarpa	Rhamnus catharticus	Rhamnus frangula	Corylus avellana	Fraxinus excelsior	Betula
Familie naam	Wilgen	Wegedoorn	Wegedoorn	Berken	Olijf	Berken
In Europa sinds	1904, Engeland	lang in cultuur	lang in cultuur	sinds de oudheid		
Oorsprong	Centraal en West-China	Europa tot Noord-Azië	Europa en Mediterraan	Europa en Mediterraan	Europa en West-Azië	
Bloeitijd	mrt apr	mei jun	jun jul aug	jan feb mrt	apr	

3 De schrale berm



03

Aantal

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

1

1

[Ligustrum obtusifolium regelianum](#)

[Olijf](#)

1885, Frankrijk

China

jun jul

2

7

[Hollandse iep](#)
[Ulmus x hollandica \(Vegeta\)](#)

[Iepen](#)

1750

Engeland

feb mrt

3

1

[Pluimiep](#)
[Ulmus glabra \(Exoniensis\)](#)


[Iepen](#)

1826

Engeland

feb mrt

4 Het Hulst-lepenbos



reuzenberenklauw
gewone berenklauw
vijfvingerkruid
beemdooievaarsbek
dagkoekoeksbloem
veldzuring

04

Aantal

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

2

14

[Hollandse iep](#)

[Ulmus x hollandica \(Vegeta\)](#)

[Iepen](#)

1750

Engeland

feb mrt

3

3

[\(Canadapopulier\)](#)

[Populus x canadensis \(Robusta\)](#)

[Wilgen](#)

1885

Frankrijk

apr

5 Berkenbosschage



stengelloze sleutelbloem
 kleine kaardenbol
 heksenkruid
 stinkende gouwe
 brunel
 speenkruid
 gewoon nagelkruid
 knikkend nagelkruid
 hop

05	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	Schietwilg		Grauwe wilg		Bittere wilg
Wetenschappelijke naam	Salix alba	Salix alba (Liempde)	Salix cinerea	Betula	Salix purpurea
Familie naam	Wilgen	Wilgen	Wilgen	Berken	Wilgen
In Europa sinds	lang in cultuur	Nederland	lang in cultuur		lang in cultuur
Oorsprong	Europa, Noord-Azië en Middellandse Zee (Knotwilg)	1890 (knotwilg)	Europa en West-Azië		Europa, Noord-Azië en Middellandse Zee
Bloeitijd	mei	mei	mrt apr		mrt apr
05	6	10	11	12	13
Aantal	1	1	1	2	1
Nederlandse naam		(Hop in Wilde lijsterbes)	Witte els	Hartbladige els	Vederesdoorn
Wetenschappelijke naam	Betula	Humulus lupulus	Alnus incana	Alnus cordata	Acer negundo
Familie naam	Berken	Hennep	Berken	Berken	Esdoorn
In Europa sinds		8e eeuw	1780, Engeland		1688, Engeland
Oorsprong		Noordelijk Halfmond	Europa, West-Azië en Noord-Amerika	zie beschrijving bij vak 4 (vervolg)	Centraal, Oost en Noord Amerika
Bloeitijd		jul aug	jan feb mrt	mrt apr	mrt apr

5 Berkenbosschage

05

Aantal

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

14

1

[Japanse esdoorn](#)

[Acer palmatum](#)

[Esdoorn](#)

1832, Engeland

Japan, Korea

mei

15

1

[Witte esdoorn](#)

[Acer saccharinum](#)

[Esdoorn](#)

1725, Engeland

Centraal, Oost en Noord-Amerika

mrt apr

16

1

[Gewone esdoorn](#)

[Acer pseudoplatanus](#)

[Esdoorn](#)

lang in cultuur

Europa en West-Azië

mei

17

1

[Suikeresdoorn](#) [Elegantier](#)

[Acer saccharum](#)

[Esdoorn](#)

1735, Engeland

Centraal, Oost en Noord-Amerika
apr

05

Aantal

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

[Berk](#)

[Els](#)

[Hazelaar](#)

[Krentenboompje](#)

1

[Ruwe berk](#)

[Betula pendula](#)

[Berken](#)

lang in cultuur
Europa en Klein-Azië
apr

05

Aantal

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

1

[Zachte berk](#)

[Betula pubescens](#)

[Berken](#)

lang in cultuur

Europa en Noord-Amerika


apr mei

[Liguster](#)

[Lijsterbes](#)

[Meidoorn](#)

6 Kalkgebied



06	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	2	1
Nederlandse naam		Vederesdoorn	Amerikaanse eik	Gewone beuk	Zomereik
Wetenschappelijke naam	Acer ginnala	Acer negundo	Quercus rubra	Fagus silvatica	Quercus robur
Familie naam	Esdoorn	Esdoorn	Beuken	Beuken	Beuken
In Europa sinds	1860, Rusland	1688, Engeland	1724, Engeland	lang in cultuur	lang in cultuur
Oorsprong	Oost-Azië	Centraal, Oost, en Noord-Amerika	Oost, Centraal en Noord-Amerika	Europa	Europa en Middellandse Zee
Bloeitijd	mei jun	mrt apr	mei	mei	mei
06	6	7	8		
Aantal	1	1	1		
Nederlandse naam	Veldiep	Gewone esdoorn	Noorse esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Ulmus minor	Acer pseudoplatanus	Acer platanoides	Vogelkers	Els
Familie naam	Iepen	Esdoorn	Esdoorn	Prunus padus	
In Europa sinds	lang in cultuur	lang in cultuur	lang in cultuur	Rozen	
Oorsprong	Europa	Europa en West-Azië	Europa en Kaukasus		
Bloeitijd	feb mrt	mei	apr mei		
06					
Aantal					
Nederlandse naam	Es	Hazelaar	Liguster	Lijsterbes	Meidoorn
Wetenschappelijke naam					Berk
Familie naam					
In Europa sinds					
Oorsprong					
Bloeitijd					

7 Paddestoelenbos



longkruid, klein springzaad, braam, fluitenkruid, heksenkruid, vlier, brandnetel, varens, kleine kaardenbol, Akelei, primula, blauwe monnikskap, gele monnikskap, look zonder look, gevlekte dovenetel, glaskruid, daslook, Gevlekte dovenetel, gevlekte aronskelk, primula (slanke sleutelbloem, gulden sleutelbloem) elfenbank, geweizwam, Inktzwam, fluweelpootje, kluijjeszwam, plooivoetstufzwam, viltige judasoor, judasoor, honingzwam, zwavelkopje, zwerminktzwam


07	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	2	1
Nederlandse naam			(Amerikaanse eik)		Spaanse aak
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris	Quercus coccinea	Quercus rubra	Quercus x schochiana	Acer campestre
Familie naam	Beuken	Beuken	Beuken	Beuken	Esdoorn
In Europa sinds	1770, Duitsland	1691, Engeland	1724, Engeland	1896, Duitsland	lang in cultuur
Oorsprong	Noordoost-Amerika	Centraal en Oost-Amerika	Oost, Centraal en Noord-Amerika		Europa en West-Azië
Bloeitijd	mei	mei	mei	apr mei	mei

7 Paddestoelenbos

07

Aantal	1	1
Nederlandse naam	Wintereik	
Wetenschappelijke naam	Quercus petraea	Quercus heterophylla
Familie naam	Beuken	Beuken
In Europa sinds	lang in cultuur	1783, België
Oorsprong	Europa en West-Azië	
Bloeitijd	mei	mei

8 Hulst-lepenbos



08

Aantal

Nederlandse naam

[Vuilboom](#)

[Vogelkers](#)

[Vlier](#)

[Een- en](#)

[Lijsterbes](#)

[Tweestijlige mei
doorn](#)

Wetenschappelijke
naam

[Prunus padus](#)

Familie naam

[Rozen](#)

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

08

Aantal

Nederlandse naam

[Kardinaalsmuts](#) [Es](#)

[Braam](#)

[Beuk](#)

Wetenschappelijke
naam


Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

9 Open bos




bostulp
hartbladzonnebloem
(voorjaarszonnebloem)

09	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	Veldiep	Noorse esdoorn	Witte esdoorn	Gewone haagbeuk	Zachte berk
Wetenschappelijke naam	Ulmus minor	Acer platanoides	Acer saccharinum	Carpinus betulus	Betula pubescens
Familie naam	Iepen	Wilgen	Esdoorn	Esdoorn	Berken
In Europa sinds	lang in cultuur	lang in cultuur	1688, Engeland	1759, Engeland	lang in cultuur
Oorsprong	Europa	Europa en Kaukus	Centraal, Oost en Noord-Amerika	Zuidoost-Europa en West-Azië	Europa en Noord-Amerika
Bloeitijd	feb mrt	apr mei	mrt apr	apr mei	apr mei

9 Open bos

	6	7	8	9	10
09 Aantal	1	1	2	1	1
Nederlandse naam	Amerikaanse linde		Vogelkers	(Treurwilg)	Zwarte els
Wetenschappelijke naam	Tilia americana	Tilia petiolaris	Prunus padus	Salix x sepulcralis (Chrysocoma)	Alnus glutinosa
Familie naam	Linde	Linde	Rozen	Koningsvaren	Berken
In Europa sinds	1752, Engeland	1818, Nederland	lang in cultuur	1815	lang in cultuur
Oorsprong	Centraal en Noord-Amerika	Zuidoost-Europa en Klein-Azië	Europa en Oost-Azië	Frankrijk	Europa, Kaukasus en Siberië
Bloeitijd	jul	jul	apr mei	mei	jan feb mrt
09 Aantal					
Nederlandse naam	Wilg	Es	Gewone vuilboom	Hazelaar	Lijsterbes
Wetenschappelijke naam			Rhamnus frangula		
Familie name			Wegedoorn		
In Europa sinds			lang in cultuur		
Oorsprong			Europa en Mediterraan		
Bloeitijd			jun jul aug		
09 Aantal					
Nederlandse naam	Meidoorn	Spaanse Aak			
Wetenschappelijke naam		Acer campestre	Vogelkers	Berk	
Familie naam		Esdoorn	Prunus padus		
In Europa sinds		lang in cultuur	Rozen		
Oorsprong		Europa en West-Azië			
Bloeitijd		mei			

10 Zandpad



10	1	2	3	4	5
Aantal	2	1	1	3	3
Nederlandse naam	Amerikaanse linde	Zilverlinde	(Treurwilg)	Gewone vlier	Bosrank
Wetenschappelijke naam	Tilia americana	Tilia tomentosa	Salix x sepulcralis (Chrysocoma)	Sambucus nigra	Clematis vitalba
Familie naam	Linde	Linde	Wilgen	Kamperfoelie	Ranonkel
In Europa sinds	1752, Engeland	1767, Engeland	1815	lang in cultuur	16e eeuw
Oorsprong	Centraal en Noord –Amerika	Zuidoost-Europa en Klein Azië	Frankrijk	Europa en Mediterraan	Europa en Mediterraan
Bloeitijd	jul	jul	mei	mei jun	jul aug sep
10	6				
Aantal	1				
Nederlandse naam	Spaanse aak	Gelderse roos	Bosrank		
Wetenschappelijke naam	Acer campestre	Viburnum opulus	Clematis vitalba	Wilg	Hazelaar
Familie naam	Esdoorn	Kamperfoelie	Ranonkel		
In Europa sinds	lang in cultuur	lang in cultuur			
Oorsprong	Europa en West-Azië	West-Europa, Noord-Azië en Mediterraan			
Bloeitijd	mei	mei jun jul			

10 Zandpad

10

Aantal

Nederlandse naam [lep](#) [Krentenboompje](#) [Liguster](#) [Meidoorn](#) [Spaanse](#) [Berk](#)

Wetenschappelijke naam

Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

[Aak](#)
[Acer](#)
[campestre](#)
[Esdoorn](#)

lang in
cultuur
Europa en
West-Azië
mei

11 Arboretum gedeelte



mannetjesvaren
steenbreekvaren
tongvaren

maarts viooltje
hondsdrif
bosrank

11	1	2	3	4	5
Aantal	3	1	4	3	1
Nederlandse naam	Bruine beuk	Krimlinde	Katsoera		
Wetenschappelijke naam	Fagus silvatica (Atropunicea)	Tilia x euchlora	Cercidiphyllum japonicum	Escallonia x langleyensis	Ribes sanguineum
Familie naam	Beuken	Linde	Cercidiphyllaceae	Grossulariaceae	Grossulariaceae
In Europa sinds Oorsprong	1884	1838, Engeland kruisingsproduct	1865, onbekend Oost-Azië en Verenigde Staten	1893, Engeland ontstaan door kruising en selectie	1826, Engeland Noordwest-Verenigde Staten
Bloeitijd	mei	jul	mei	jun jul aug	apr mei
11	6	7	8	9	10
Aantal	1	2	1	1	4
Nederlandse naam	Alpenbes	Gele alpenbes	Papierberk		
Wetenschappelijke naam	Ribes alpinum	Ribes aureum	Betula papyrifera	Ribes americanum	Callicarpa bodinieri
Familie naam	Grossulariaceae	Grossulariaceae	Berken	Grossulariaceae	Ijzerhard
In Europa sinds Oorsprong	lang in cultuur Europa	1812, Engeland West, Centraal en Noord-Amerika	Noord-Amerika	1729, Engeland Oost, Centraal en Noord-Amerika	1897, Duitsland China
Bloeitijd	mei	apr mei	apr mei	apr mei	jun jul aug

11 Arboretum gedeelte

11	12	13			
Aantal	2	2			
Nederlandse naam		(Specerijstruik)	Spaanse Aak	Berk	Bosrank
Wetenschappelijke naam	Caryopteris x clandonensis	Calycanthus floridus	Acer campestre		Clematis vitalba
Familie naam	IJzerhard	Specerijstruik	Esdoorn		Ranonkel
In Europa sinds	1930	1726, Engeland	lang in cultuur		
Oorsprong	Engeland	Oost en Noord-Amerika	Europa en West-Azië		
Bloeitijd	aug sep	jun jul aug	mei		

11					
Aantal					
Nederlandse naam	Es	Hazelaar	Iep	Krentenboompje	Liguster
Wetenschappelijke naam					
Familie naam					
In Europa sinds					
Oorsprong					
Bloeitijd					

11					
Aantal					
Nederlandse naam	Lijsterbes	Meidoorn			
Wetenschappelijke naam					
Familie naam					
In Europa sinds					
Oorsprong					
Bloeitijd					

12 Coniferenveld



kardinaalsmuts

12	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	1	2
Nederlandse naam	(Bittere wilg)	Pluimes			
Wetenschappelijke naam	Salix purpurea (Amplexicaulus)	Fraxinus ornus	Mahonia wagneri (Pinnacle)	Mahonia aquifolium	Mahoberberis x neubertii
Familie naam	Wilgen	Olijf	Berberis	Berberis	Berberis
In Europa sinds	1904	lang in cultuur	1930	1820, Duitsland	1850, Frankrijk
Oorsprong	Duitsland	Zuid-Europa en West-Azië	Nederland	West-Canada en Noord-West Staten	Verenigde Staten
Bloeitijd	mrt apr	mei jun	apr mei	apr mei	
12	6	7	8	9	10
Aantal	2	2	1	1	2
Nederlandse naam		Gewone kardinaalshoed	Tulpeboom	(Zuurbes)	Moseik/Turkse eik
Wetenschappelijke naam	Euonymus alatus	Euonymus europeus	Liriodendron tulipifera	Berberis vulgaris	Quercus cerris
Familie naam	Kardinaalsmuts	Kardinaalsmuts	Tulpenboom	Berberis	Beuken
In Europa sinds	1856, Nederland	lang in cultuur	1663, Engeland	1594, Nederland	1735, Engeland
Oorsprong	Oost-Azië	Europa en West-Azië	Oost-Verenigde Staten	Europa	Oost-Mediterraan
Bloeitijd	mei jun	mei	jun	mei	mei


12 Coniferenveld

12	11	12	13	14	15
Aantal	1	2	2	3	4
Nederlandse naam					
Wetenschappelijke naam	Berberis wilsoniae	Berberis koreana	Berberis aggregata	Berberis verruculosa	Berberis x media
Familie naam	Berberis	Berberis	Berberis	Berberis	Berberis
In Europa sinds		1905, Engeland	1903, Engeland	1904, Engeland	
Oorsprong	West-China	Korea	West-China	West-China	
Bloeitijd	jun jul	mei	mei jun	mei jun	
12	16	17	18	19	20
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam					
Wetenschappelijke naam	Berberis gagnepainii	Berberis x mentorensis	Berberis jul anae	Berberis thunbergii	Berberis x stenophylla
Familie naam	Berberis	Berberis	Berberis	Berberis	Berberis
In Europa sinds	1904, Engeland		1900, Engeland	1860, Nederland	1860
Oorsprong	West China	Kruising B.jul anae x B. thunbergii, 1925	Centraal-China	Japan	Engeland
Bloeitijd	mei jun	Verenigde Staten apr mei	mei jun	mei	mei
12	21	22	23	24	25
Aantal	1	1	3	2	
Nederlandse naam		(Mammoetboom	Fluweelboom		
Wetenschappelijke naam	Berberis x ottawensis	Sequoiadendron giganteum	Rhus typhina	Elaeagnus x ebbingei	
Familie naam	Berberis	Moerascipres	Anacardiaceae	Olijfwilg	
In Europa sinds		1853, Engeland	1622, Frankrijk	1927	
Oorsprong	Kruising B.thunbergii x B.vulgaris, 1881, Canada	Californië, Verenigde Staten	Centraal, Oost en Noord-Amerika	kruisingsprodukt, Nederland	
Bloeitijd	mei	mei	jun jul	sep okt	
12	26	27	28	29	30
Aantal	1	1	2	1	1
Nederlandse naam	(Pruikeboom)	Koreaanse zilverspar		Servische spar	
Wetenschappelijke naam	Cotinus coggygria	Abies koreana	Picea pungens	Picea omorika	niet zeker
Familie naam	Pruikeboom	Dennen	Dennen	Dennen	Abies ?firma?
In Europa sinds	1594, Nederland	1905, Frankrijk	1863, onbekend	1880, Duitsland	
Oorsprong	Zuid-Europa tot China	Korea	West-Verenigde Staten	West-Balkan	Dennen
Bloeitijd	jun jul	mei	mei	mei	

12 Coniferenveld

12	31	32	33	34	35
Aantal	1	1	1	1	3
Nederlandse naam	Griekse zilverspar		(Douglas spar)	Fijnspar	Scherpe/Groene hulst
Wetenschappelijke naam	Abies ?cephalonica?	Abies concolor	Pseudotsuga menziesii	Picea abies	Ilex aquifolium
Familie naam	Dennen	Dennen	Dennen	Dennen	Hulst
In Europa sinds	1824, Engeland	1851, Engeland	1827	lang in cultuur	sinds Oudheid
Oorsprong	Griekenland	West-Verenigde Staten	West-Canada, West en Zuid-Verenigde Staten	Europa	West-Europa en China
Bloeitijd	mei	mei	mei	mei	mei
12				W 3	Y11
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	Sitka spar		Edele zilverspar	(Boksdoorn)	
Wetenschappelijke naam	Picea sitchensis	Abies nordmanniana	Abies procera	Lycium barbarum	Elaeagnus angustifolia
Familie naam	Dennen	Dennen	Dennen	Nachtschade	Olijfwilg
In Europa sinds	1831, Engeland	1840, Engeland	1827, Engeland	lang in cultuur	1594, Nederland
Oorsprong	West en Noord-Amerika	Kaukasus en Klein-Azië	West-Verenigde Staten	Europa en Middellandse Zee	Mediterraan tot Centraal-Azië
Bloeitijd		mei			mei jun
12	Y12				
Aantal	1				
Nederlandse naam					
Wetenschappelijke naam	Elaeagnus pungens				
Familie naam	Olijfwilg				
In Europa sinds	1830, België				
Oorsprong	Japan				
Bloeitijd	okt				

13 Westelijke en Oostelijke Oever



moeras-vergeet-me-niet-je
 moeraswalstro
 gele lis
 moerasspirea
 heelblaadje
 moeraswespenorchis
 brede orchis
 rietorchis
 moeraswespenorchis

dotterbloem
 kievitsbloem
 valeriaan

13 (?)	1	2	3	4	5
Aantal	3	1	1	1	1
Nederlandse naam	Kruipwilg	Grijze wilg			
Wetenschappelijke naam	Salix repens	Salix elaeagnos	Betula nigra	Deutzia gracilis	Deutzia x rosea
Familie naam	Wilgen	Wilgen	Berken	Hortensia	Hortensia
In Europa sinds	lang in cultuur	1762, Frankrijk	1736, Engeland	1829, Nederland	1895
Oorsprong	Europa en Noord-Azië	Centraal en Zuid-Europa en Klein-Azië	Oost en Centraal-Verenigde Staten	Japan	Frankrijk
Bloeitijd	apr	apr mei	apr mei	mei	jun jul

13 Westelijke en Oostelijke Oever

13	6	7	8	9	10
Aantal	1	2	1	5	1
Nederlandse naam			(klimheester in Jasmijn)	Boerenjasmijn	(Welriekende jasmijn)
Wetenschappelijke naam	Deutzia scabra	Philadelphus grandiflorus	Akebia quinata	Philadelphus (Virginal)	Philadelphus coronarius
Familie naam	Hortensia	Hortensia	Augurkenstruik	Hortensia	Hortensia
In Europa sinds	1833, Engeland	1809, Duitsland	1845, Engeland		1573
Oorsprong	China en Japan	Zuid Oost-Verenigde Staten	Oost-Azië	ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten	oorspronkelijk wild, Oostenrijk
Bloeitijd	jun jul	jun	mei jun	mei jun	mei jun
13	11	12	13	14	15
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	Gewone vleugelnoot	Katwilg		Gewone braam	(Klimhortensia)
Wetenschappelijke naam	Pterocarya fraxinifolia	Salix viminalis	Salix caprea (Kilmarnock)	Rubus fruticosus	Hydrangea anomala petiolaris
Familie naam	Noot	Wilgen	Wilgen	Rozen	Hortensia
In Europa sinds	1782, Engeland	lang in cultuur		lang in cultuur	1878, Engeland
Oorsprong	Kaukasus en West-Azië	Europa, Klein-Azië	cultuurvariëteit		Oost-Azië
Bloeitijd	mei	mrt apr	mrt apr	jun jul aug	jun jul
13	16	17	18	19	20
Aantal	2		1	1	1
Nederlandse naam	(Pluimhortensia)		Tamme kastanje	Bloemwilg	Drents krentenboompje
Wetenschappelijke naam	Hydrangea paniculata		Castanea sativa	Itea virginica	Amelanchier lamarckii
Familie naam	Hortensia		Beuken	Hortensia	Rozen
In Europa sinds	1860, Nederland		lang in cultuur	1744, Engeland	1781, Duitsland
Oorsprong	China en Japan		Europa en Mediterraan	Oost-Verenigde Staten	Oost en Noord-Amerika, in Duitsland verwilderd
Bloeitijd	jul aug sep		jun jul	mei jun	apr mei

13 Westelijke en Oostelijke Oever

13	21	22	23	24	
Aantal	2	1	1	1	
Nederlandse naam	Kogelbloem	Krimlinde	Witte paardekastanje	(Bamboe)	Bosrank
Wetenschappelijke naam	Cephalanthus occidentalis	Tilia x euchlora	Aesculus hippocastanum	Arundinaria?	Clematis vitalba
Familie naam	Walstro	Linde	Paardenkastanje	Grassen	Ranonkel
In Europa sinds	1735, Engeland	1838, Engeland	1557		
Oorsprong	Noord-Amerika	kruisingsprodukt	Balkan	Japan, Korea	
Bloeitijd	jul aug		mei		

13

Aantal					
Nederlandse naam	Vuilboom	Vogelkers	Lijsterbes	Liguster	Krentenboompje
Wetenschappelijke naam		Prunus padus			
Familie naam		Rozen			
In Europa sinds					
Oorsprong					
Bloeitijd					

13

Aantal					
Nederlandse naam	Hazelaar	Es	Braam	Wilg	Berk
Wetenschappelijke naam					
Familie naam					
In Europa sinds					
Oorsprong					
Bloeitijd					

13

Aantal	1	1		1	1
Nederlandse naam	Rode paardekastanje		Els		
Wetenschappelijke naam	Aesculus x carnea	Deutzia x kalmiiflora		Deutzia scabra	Hydrangea arborescens
Familie naam	Paardenkastanje	Steenbreek		Steenbreek	Steenbreek
In Europa sinds	1800	1897		1833, Engeland	
Oorsprong	Frankrijk	Frankrijk		China en Japan	Oost en Centraal-Verenigde Staten
Bloeitijd		mei			

13 Westelijke en Oostelijke Oever

13

Aantal

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

X 7


1

[Escallonia
virgata](#)

1866, Engeland

Chili

14 Sierheesters en bomen




14	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	(Chinees klokje)	(Chinees klokje)		Gewone sering	Geoorde wilg
Wetenschappelijke naam	Forsythia x intermedia	Forsythia ovata (Tetragold)	Ligustrum	Syringa vulgaris	Salix aurita
Familie naam	Olijf	Olijf	Olijf	Olijf	Wilgen
In Europa sinds	1889	1949		1554, Italië	lang in cultuur
Oorsprong	kruisingsproduct , Duitsland	Nederland (proefstation Boskoop)		Centraal en Zuidoost-Europa	Europa en West-Azië
Bloeitijd	apr	feb mrt apr		mei	mrt apr
14	6	7	8	9	10
Aantal	4	1		2	1
Nederlandse naam	Herfstpaardenkastanje	Wilde liguster		(Vlinderstruik)	
Wetenschappelijke naam	Aesculus parviflora	Ligustrum vulgare		Buddleia davidii	Buddleia alternifolia
Familie naam	Paardenkastanje	Olijf		Buddleja	Buddleja
In Europa sinds	1786, Engeland	lang in cultuur		1893, Frankrijk	1914, Engeland
Oorsprong	Zuidoost Verenigde Staten	Europa en Mediterraan		China	Noordwest-China
Bloeitijd	jul aug	jun jul		aug sep	jun

14 Sierheesters en bomen

14	11	12	13	14	15
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam		Japanse wijnbes		Prachtframboos	Japanse notenboom
Wetenschappelijke naam	Betula	Rubus phoenicolasius	Carpinus betulus (Fastigiata)	Rubus spectabilis	Ginkgo biloba
Familie naam	Berken	Rozen	Berken	Rozen	Ginkgo
In Europa sinds		1876, Frankrijk	1876	1827, Engeland	1730, Nederland
Oorsprong		Oost-Azië	Duitsland	West en Noord-Amerika	China
Bloeitijd		mei jun	apr mei	mrt apr	apr
14	16	17	18	19	20
Aantal	1	2	1	1	1
Nederlandse naam			Hongaarse sering	Framboos	
Wetenschappelijke naam	Rubus odoratus	Syringa reflexa	Syringa josikaea	Rubus idaeus	Aesculus ?pavia?
Familie naam	Rozen	Olijf	Olijf	Rozen	Paardenkastanje
In Europa sinds	1635, Frankrijk	1910, Amerika	1830, Oostenrijk	lang in cultuur	
Oorsprong	Centraal, Oost en Noord-Amerika	Centraal-China	Karpathen	Noordelijk-Halfrond	Noord-Amerika
Bloeitijd	jul aug	jun	mei jun	mei jun jul aug	mei jun
14	21	22	23	24	25
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam		Perzische sering			Phillyrea vilmoriniana
Wetenschappelijke naam	Forsythia viridissima	Syringa x persica	Betula	Forsythia suspenda	Osmanthus decorus
Familie naam	Olijf	Olijf	Berken	Olijf	Olijf
In Europa sinds	1844, Engeland	1640		1833, Nederland	1866, Frankrijk
Oorsprong	China	kruisingsprodukt, Engeland		China	West-Azië
Bloeitijd	apr	mei		apr	mei
14	U 6	U10	U11	U12	
Aantal	1	1	1	1	
Nederlandse naam					
Wetenschappelijke naam	Rubus flosculosus	Ceanothus x delilianus	Osmanthus x burkwoodii	Osmanthus heterophyllus	
Familie naam	Rozen	Wegendoorn	Olijf	Olijf	
In Europa sinds			1925	1843, Nederland	
Oorsprong	China ingevoerd Verenigde Staten in 1907	kruisingsprodukt	Engeland	Japan	
Bloeitijd					

15 Sierheesters en bomen



15	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	3	3	3
Nederlandse naam		Kaimastruik	Struik ganzerik	Ranonkelstruik	Chinese moerascipres
Wetenschappelijke naam	Aesculus ?pavia?	Rhodotypos scandens	Potentilla fruticosa	Kerria japonica	Metasequoia glybtostroboides
Familie naam	Paardenkastanje	Rozen	Rozen	Rozen	Moerascipres
In Europa sinds		1860, Nederland	lang in cultuur	1700, Engeland	
Oorsprong	Noord-Amerika	China en Japan	Europa, Noord-Azië en China	Japan	Centraal-China, ingevoerd Verenigde Staten in 1945
Bloeitijd	mei jun	mei jun jul	jun jul aug sep	mei jun	
15	6	7	8	9	10
Aantal	2	1	3	4	1
Nederlandse naam		Witte kornoelje			
Wetenschappelijke naam	Cornus kousa	Cornus alba	Cornus florida	Aucuba japonica (Variegata)	Photinia davidiana
Familie naam	Kornoelje	Kornoelje	Kornoelje	Kornoelje	Rozen
In Europa sinds	1860, Nederland	1741, Engeland	1731, Engeland	1783, Engeland	1917, Engeland
Oorsprong	Japan en Korea	Oost-Europa en Noord-Azië	Centraal, Oost en Noord-Amerika	Japan	West-China
Bloeitijd	mei jun	mei jun	mei	mrt apr	jun

15 Sierheesters en bomen

15	11	11	12	13	13
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam					
Wetenschappelijke naam	Cotoneaster dielsianus	Broussonetia papyrifera	Carpinus betulus (Fastigiata)	Cotoneaster rotundifolius	Cotoneaster bullatus
Familie naam	Rozen	Moerbezie	Berken	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1900, Engeland	1751, Engeland		1825, Engeland	1897, Frankrijk
Oorsprong	West en Centraal China	China en Japan	zie beschrijving bij vak 14	Himalaja	West China
Bloeitijd	jun	mei	apr mei	jun	mei jun
15	14	15	17	19	21
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam					
Wetenschappelijke naam	Cotoneaster horizontalis	Cotoneaster x watereri	Cotoneaster wardii	Cotoneaster conspicuus	Cotoneaster dammeri
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1877, Frankrijk		1931, Engeland	1924, Engeland	1900, Engeland
Oorsprong	West China	kruisingsprodukt	Tibet	Tibet	Centraal China
Bloeitijd	mei jun	jun	jun	mei jun	mei
15	23	25	27	29	31
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam					
Wetenschappelijke naam	Cotoneaster franchetii	Cotoneaster simonsii	Cotoneaster divaricatus	Cotoneaster zabelii	Cotoneaster salicifolius
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1889, Frankrijk	1860, Engeland	1904, Engeland	1907, Engeland	1908, Amerika
Oorsprong	West China	Khasia gebergte (Zuid Azië)	Centraal en West China	Centraal China	West China
Bloeitijd	jun	jun jul	jun jul	mei jun	jun

16 Sierheesters en bomen



16	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	3	4	1
Nederlandse naam	Gaspeldoorn	Himalaya ceder			
Wetenschappelijke naam	Ulex europaeus	Cedrus deodara	Tamarix pentandra	Ilex crenata	Tamarix ?ramossisima?
Familie naam	Vlinderbloem	Dennen	Tamarisk	Hulst	Tamarisk
In Europa sinds	1594, Nederland	1822, Engeland	1883, onbekend	1860, Nederland	1885, Rusland
Oorsprong	Centraal West Europa	Azië (Himalaja)	Oost Mediterraan tot Centraal Azië	Japan ingevoerd	Zuid Oost Rusland
Bloeitijd	feb mrt apr mei	sep okt	jul aug sep	mei jun	jul aug sep okt

16 Sierheesters en bomen

16	6	7	8	9	10
Aantal	1	2		1	1
Nederlandse naam		Japanse lork			Gele ceder
Wetenschappelijke naam	Tamarix tetrandra	Larix kaempferi		Tsuga canadensis	Cedrus atlantica (Aurea)
Familie naam	Tamarisk	Dennen		Dennen	Dennen
In Europa sinds	1821	1861, Engeland		1736, Engeland	1932
Oorsprong	Oost Mediterraan	Japan		Oost en Noord Amerika	Nederland
Bloeitijd	apr mei	mrt apr		mei	sep okt
16	11	12	13	14	15
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam		(Vuurdoorn)	(Vuurdoorn)		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus (Fastigiata)	Pyracantha (Golden Charmer)	Pyracantha coccinea	Betula pendula (Purpurea)	Pyracantha
Familie naam	Berken	Rozen	Rozen	Berken	Rozen
In Europa sinds	1876	1950	1594, Nederland	1870	
Oorsprong	Duitsland	Duitsland	Zuid-Europa en West-Azië	Frankrijk	
Bloeitijd	apr mei	jun	mei jun	apr	jun
16	16	17	18	19	20
Aantal	1	1	5	1	1
Nederlandse naam		(Dwergkwee)	(Dwergkwee)		Kwee
Wetenschappelijke naam	Nothofagus antarctica	Choenomeles speciosa	Choenomeles japonica	Pyrus salicifolia	Cydonia oblonga
Familie naam	Beuken	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1840, Engeland	1778, Nederland	1869, Engeland	1780, Engeland	lang in cultuur
Oorsprong	Zuid-Amerika	China	Japan	Balkan en West- Azië	Centraal-Azië
Bloeitijd	mei	apr mei	mrt apr	apr mei	mei
16	21	22	23	24	25
Aantal	1	1	5	4	1
Nederlandse naam		Oostenrijkse den	Corsicaanse den	Weymouthsden	Bergden
Wetenschappelijke naam	Pyrus communis	Pinus nigra nigra	Pinus nigra maritima	Pinus strobus	Pinus mugo
Familie naam	Rozen	Dennen	Dennen	Dennen	Dennen
In Europa sinds	lang in cultuur	1835, Engeland	1788, Engeland	Frankrijk	1768, Engeland
Oorsprong	Europa en West- Azië	Zuidoost-Europa	Corsica en Zuid- Italië	Centraal, Oost en Noord- Amerika 16e eeuw	Europa
Bloeitijd	apr mei	jun	jun	mei jun	

16 Sierheesters en bomen

16	26	27	28	29	30
Aantal	1	2	1		1
Nederlandse naam	Zeeden	Grove den	Tranenden		
Wetenschappelijke naam	Pinus pinaster	Pinus silvestris	Pinus wallichiana		Amorpha fruticosa
Familie naam	Dennen	Dennen	Dennen		Vlinderbloem
In Europa sinds	lang in cultuur	lang in cultuur	1823, Engeland		1724 , Engeland
Oorsprong	West-Mediterraan	Europa en Noord-Azië	Himalaja		Centraal en Oost-Verenigde Staten
Bloeitijd	jun	mei jun	jun		jun jul aug
16	31	32	33	34	35
Aantal	1	2	1	1	1
Nederlandse naam		(Voorjaarsbrem)	Duindoorn		Zwarte walnoot
Wetenschappelijke naam	Sophora japonica	Cytisus x praecox	Hippophae rhamnoides	Koelreuteria paniculata	Juglans nigra
Familie naam	Vlinderbloem	Vlinderbloem	Olijfwilg	Sapindaceae	Noot
In Europa sinds	1750, Frankrijk	1867	lang in cultuur	1750, Frankrijk	1629, Engeland
Oorsprong	China en Korea	Engeland	Europa en China	Oost-Azië	Centraal en Oost-Verenigde Staten
Bloeitijd	aug sep	apr mei	mrt apr	jul aug	apr mei
16	36	37	38	39	40
Aantal	2	2	1	1	1
Nederlandse naam	(Blazenstruik)	Erwtenstruik	Japanse notenboom	(Blazenstruik)	Zoutstruik
Wetenschappelijke naam	Colutea arborescens	Caragana arborescens	Ginkgo biloba	Colutea x media	Halimodendron halodendron
Familie naam	Vlinderbloem	Vlinderbloem	Ginkgo	Vlinderbloem	Vlinderbloem
In Europa sinds	1568, Engeland	1748, Zweden	1730, Nederland	1623	1779, Nederland
Oorsprong	Mediterraan	Siberië en Mandsjoerije	China	kruising C. aborescens en C. orientalis, Frankrijk	West-Azië
Bloeitijd	mei jun jul aug	mei jun	apr	mei jun jul aug sep	jun jul
16	41				
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	Atlasceder		(Blazenstruik)	(Blazenstruik)	
Wetenschappelijke naam	Cedrus atlantica		Colutea arborescens	Colutea orientalis	Cytisus procumbens
Familie naam	Dennen		Vlinderbloem	Vlinderbloem	Vlinderbloem
In Europa sinds	1839, Frankrijk		1568, Engeland	1700, Frankrijk	1808, Engeland
Oorsprong	Noordwest-Afrika (Atlas)		Mediterraan	Orient	Zuidoost-Europa
Bloeitijd	sep okt				

16 Sierheesters en bomen

16

Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam		Verfbrem	Pekden	Alpenden	
Wetenschappelijke naam	Cytisus supinus	Genista tinctoria	Pinus rigida	Pinus cembra	Tsuga heterophylla
Familie naam	Vlinderbloem	Vlinderbloem	Dennen	Dennen	Dennen
In Europa sinds	1755, Oostenrijk	1600, Nederland	1750, Frankrijk	1746, Engeland	1851, Engeland
Oorsprong	Centraal Zuid-Europa	Europa en West-Azië	Oost en Noord-Amerika	Noordoost-Europa en Noord Azië	West en Noord-Amerika
Bloeitijd					

17 Dijk en Uiterwaard




echte koekoeksbloem
wederik
pinksterbloem
kroonkruid
agrimonie
brunel
knoopkruid
veldlathyrus
margriet
ratelaar

17	1	2	3	4	5
Aantal	1	3	3	4	1
Nederlandse naam	Schietwilg		Waterwilg	(Moerascipres)	Katwilg
Wetenschappelijke naam	Salix alba	Salix daphnoides	Salix caprea	Taxodium distichum	Salix viminalis
Familie naam	Wilgen	Wilgen	Wilgen	Moerascipres	Wilgen
In Europa sinds	lang in cultuur	1796, Duitsland	lang in cultuur	1640, Engeland	lang in cultuur
Oorsprong	Europa, Noord-Azië en Middellandse Zee, (Knotwilg)	Europa, Centraal-Azië en Himalaja	Europa en Noord-Azië	Zuid en Zuidoost-Verenigde Staten	Europa en Klein-Azië
Bloeitijd	apr mei	mei	mrt apr	mrt apr	mei
17	6	7	8	9	10
Aantal	2	1	3	1	1
Nederlandse naam	Winter/Kleinbladi Witte moerbeige linde		(Duivelswandelstok)		
Wetenschappelijke naam	Tilia cordata	Morus alba	Aralia elata	Acanthopanax sieboldianus	Cornus sericea
Familie naam	Linde	Moerbezie	Klimop	Klimop	Kornoelje
In Europa sinds	lang in cultuur	sinds de Oudheid	1859, Rusland	1856, Nederland	1781, Duitsland
Oorsprong	Europa	China	Oost-Azië	Japan	Centraal, Oost en Noord-Amerika
Bloeitijd	jun	jun	mei	jul aug sep	jun jul

17 Dijk en Uiterwaard

17	11	12	13	14	15
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	Rode kornoelje	Gele kornoelje		Drents krentenboompje	
Wetenschappelijke naam	Cornus sanguinea	Cornus mas	Betula	Amelanchier lamarckii	Ostrya carpinifolia
Familie naam	Kornoelje	Kornoelje	Berken	Rozen	Berken
In Europa sinds	lang in cultuur	lang in cultuur		1781, Duitsland	1724, Engeland
Oorsprong	Europa	Europa en West-Azië		Oost en Noord-Amerika, in Duitsland verwilderd	Mediterraan
Bloeitijd	mei jun jul	feb mrt		apr mei	apr mei
17	16	17	18		
Aantal	1	1	1		
Nederlandse naam	Ruwe berk	Zachte berk	Zwarte els		
Wetenschappelijke naam	Betula pendula	Betula pubescens	Alnus glutinosa		
Familie naam	Berken	Berken	Berken		
In Europa sinds	lang in cultuur	lang in cultuur	lang in cultuur		
Oorsprong	Europa en Klein-Azië	Europa en Noord-Amerika	Europa, Kaukasus en Siberië,		
Bloeitijd	apr	apr mei	jan feb mrt		

18 Sierheesters en bomen




18	1	2	3	4	5
Aantal	2	3	2	1	1
Nederlandse naam				Witte moerbeï	
Wetenschappelijke naam	Malus prunifolia	Malus baccata	Parrotia persica	Morus alba	Malus sargentii
Familie naam	Rozen	Rozen	Toverhazelaar	Moerbezie	Rozen
In Europa sinds	1758, Engeland	1794, Duitsland	1840, Engeland	sinds Oudheid	1892, USA
Oorsprong	Noordoost-Azië,	Noordoost-Azië	Iran	China	Japan
Bloeitijd	mei	mei	mrt	mei	mei
18	6	7	8	9	10
Aantal	3	1	1	1	1
Nederlandse naam			Appel	Sierappel	
Wetenschappelijke naam	Malus floribunda	Malus toringo	Malus domestica	Malus (...)	Corylopsis spicata
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen	Toverhazelaar
In Europa sinds	1856, Nederland	1845, Nederland	lang in cultuur		1856 , Nederland
Oorsprong	Japan	Japan	Europa en West-Azië	vroeger M, purpurea, nu onderverdeeld in variëteiten	Japan
Bloeitijd	mei	mei	mei	mei	mrt apr

18 Sierheesters en bomen

18	11	12	13
Aantal	5	2	1
Nederlandse naam	Amerikaanse toverhazelaar		Zwarte els
Wetenschappelijke naam	Hamamelis virginiana	Hamamelis mollis	Alnus glutinosa
Familie naam	Toverhazelaar	Toverhazelaar	Berken
In Europa sinds	1737, Engeland	1629, Engeland	lang in cultuur
Oorsprong	Centraal en Oost-Verenigde Staten	Centraal en Oost-Verenigde Staten	Europa, Kaukasus en Siberië
Bloeitijd	sep okt	jan feb mrt december	jan feb mrt

19 Sierheesters en bomen



19	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	2	1
Nederlandse naam	Zevenboom		Jeneverbes		
Wetenschappelijke naam	Juniperus sabina	Chamaecyparis lawsoniana (...)	Juniperus communis (Hibernica)	Juniperus x media (Pfitzerana)	Chamaecyparis pisifera (Filifera)
Familie naam	Cypres	Cypres	Cypres	Cypres	Cypres
In Europa sinds	sinds Oudheid		lang in cultuur	1899	1861 , Engeland
Oorsprong	Centraal-Europa, Mediterraan en Siberië	cultuurvariëteit	Noordelijk-Halfrond	Duitsland	Japan, lang in cultuur
Bloeitijd	apr		apr	apr	mrt apr

19 Sierheesters en bomen

19	6	7	8	9	10
Aantal	2	1	1	2	1
Nederlandse naam	Californische cypres	(Oosterse levensboom)		Westerse levensboom	Reuzen levensboom
Wetenschappelijke naam	Chamaecyparis lawsoniana	Thuja orientalis (Elwoodii)	Chamaecyparis lawsoniana (Alumii)	Thuja occidentalis	Thuja plicata
Familie naam	Cypres	Cypres	Cypres	Cypres	Cypres
In Europa sinds	1854, Engeland	1700, Frankrijk	1870	1534, Frankrijk	1853, Engeland
Oorsprong	Noordwest Verenigde Staten	China en Korea	Engeland	Oost en Noord-Amerika	West en Noord-Amerika
Bloeitijd	mrt apr	apr	mrt apr	mrt apr	apr
19	11	12	13	14	15
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam			Gewone taxus		
Wetenschappelijke naam	Taxus cuspidata	Taxus baccata (Repandens)	Taxus baccata	Juniperus chinensis (Blauw)	Chamaecyparis nootkatensis (Pendula)
Familie naam	Taxus	Taxus	Taxus	Cypres	Cypres
In Europa sinds	1855, Engeland	1887	sinds de Oudheid	1924, Nederland	1850, Rusland
Oorsprong	Oost-Azië	Frankrijk	Europa en Mediterraan		West-Canada en Noordwest-Verenigde Staten
Bloeitijd	feb mrt apr	mrt apr	mrt apr	apr	mrt apr
19	16	17	18	19	
Aantal	1	1	1	1	
Nederlandse naam			Cederhoutboom		
Wetenschappelijke naam	Thuja occidentalis (...)	Chamaecyparis lawsoniana (Stewartii)	Juniperus virginiana	x Cupressocyparis leylandii	
Familie naam	Cypres	Cypres	Cypres	Cypres	
In Europa sinds		1900, Engeland	1648, Engeland	1888, Engeland	
Oorsprong	cultuurvariëteit		Oost en Noord-Amerika	kruising Chamaecyparis x Cupressus, onbekend	
Bloeitijd	mrt apr	mrt apr	apr		

20 Sierheesters en bomen



20	15	16	17	18	19
Aantal	1	2	1	1	1
Nederlandse naam		Hemelboom		Sleedoorn	
Wetenschappelijke naam	Exochorda racemosa	Ailanthus altissima	reserve	Prunus spinosa	Prunus subhirtella
Familie naam	Rozen	Hemelboom		Rozen	Rozen
In Europa sinds	1849, Engeland	1750, Frankrijk		lang in cultuur	Japan en
Oorsprong	Oost-China	China, in Frankrijk verwilderd		Europa en Midderraan	ingevoerd Verenigde Staten in 1984
Bloeitijd	mei	jun jul		mrt apr	apr mei
20	20	21	22	23	24
Aantal	1	2	1	1	1
Nederlandse naam				Japanse sierkers	Kerspruim
Wetenschappelijke naam	Prunus cerasifera (Nigra)	Prunus serrula	Catalpa bignonioides	Prunus serrulata (...)	Prunus cerasifera
Familie naam	Rozen	Rozen	Trompetboom	Rozen	Rozen
In Europa sinds		1908, Engeland	1726, Engeland		1594, Nederland
Oorsprong	Verenigde Staten	West-China	Zuidoost-Amerika	alleen cultuurvariëteiten zijn in cultuur	Balkan en West-Azië
Bloeitijd	apr	apr	jun jul	apr mei	apr

20 Sierheesters en bomen

	20	25	26	27	28	29
Aantal		1	1	1	1	1
Nederlandse naam			Gelderse roos	Gewone laurierkers	Vogelkers	Weichselboom
Wetenschappelijke naam		Prunus sargentii	Viburnum opulus	Prunus laurocerasus	Prunus padus	Prunus mahaleb
Familie naam		Rozen	Kamperfoelie	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds		1872, Frankrijk	lang in cultuur	1558, Italië	lang in cultuur	lang in cultuur
Oorsprong		Japan	Europa, Noord-Azië en Mediterraan	Balkan en Klein-Azië	Europa en Oost-Azië	Europa en West-Azië
Bloeitijd		apr	mei jun	mei	mei	apr mei

21 Sierheesters en bomen



21	1	2	3	4	5
Aantal	2	5	1	2	2
Nederlandse naam					Thunbergspirea
Wetenschappelijke naam	Rosa moyesii	Rosa virginiana	Rosa omei ensis	Photinia villosa	Spiraea thunbergii
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1903, Engeland	1696, Engeland	1901, Engeland	1862, Nederland	1859, Nederland
Oorsprong	West-China	Centraal en Oost-Verenigde Staten	West-China	Oost-Azië	China en Japan
Bloeitijd	jun jul	jul aug	mei jun	mei jun	apr mei
21				8	9
Aantal				3	2
Nederlandse naam					
Wetenschappelijke naam				Spiraea x arguta	Spiraea x bumalda
Familie naam				Rozen	Rozen
In Europa sinds				1884, Duitsland	1890, België
Oorsprong				kruisingsproduct	kruisingsproduct
Bloeitijd				mei	jun jul aug sep
21	10	11	12	13	14
Aantal	1	1	1	2	1
Nederlandse naam		Lijsterbessspirea			
Wetenschappelijke naam	Sorbaria tomentosa	Sorbaria sorbifolia	Physocarpus opulifolius	Stephanadra tanakae	Stephanadra incisa
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1840, Engeland	1759, Engeland	1690, Nederland	1893, Engeland	1872, Rusland
Oorsprong	Himalaja	Azië	Noordoost en Noord-Amerika	Japan	Japan en Korea
Bloeitijd	jul aug	jun jul aug	jun jul	jun jul	jun jul

21 Sierheesters en bomen

21	30	31	32	33	34
Aantal	2	3	1	2	3
Nederlandse naam	Amandel	Perzik	Zoete kers / Kriek	Amberboom	Amandelboompijpe
Wetenschappelijke naam	Prunus dulcis	Prunus persica	Prunus avium	Liquidamber styraciflua	Prunus triloba
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Toverhazelaar	Rozen
In Europa sinds	lang in cultuur	sinds Oudheid	lang in cultuur	1640, Nederland	1855, Engeland
Oorsprong	Centraal en West-Azië	niet wild bekend	Europa en West-Azië	Oost en Centraal-Verenigde Staten en Mexico	Oost-Azië lang in cultuur
Bloeitijd	mrt apr	mrt apr	apr mei	apr mei	apr mei
21	35	36	E 3	E 5	E12
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	Gewone acacia	Drents krentenboompje		Amerikaanse vogelkers	
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia	Amelanchier lamarckii	Prunus x blireiana	Prunus serotina	Aronia melanocarpa
Familie naam	Vlinderbloem	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1601, Frankrijk	1781, Duitsland	1895, Frankrijk	1629, Engeland	1700, Engeland
Oorsprong	Centraal en Oost-Verenigde Staten	Oost en Noord-Amerika	Kruisingsprodukt	Noord-Amerika	Oost en Noord-Amerika
Bloeitijd	jun	apr mei			
21	E21				
Aantal	1		2	2	
Nederlandse naam	Virginische vogelkers	Witte Kornoelje			Berk
Wetenschappelijke naam	Prunus virginiana	Cornus alba	Spiraea sargentiana	Spiraea trichocarpa	
Familie naam	Rozen	Kornoelje	Rozen	Rozen	
In Europa sinds	1665, Frankrijk			1920, onbekend	
Oorsprong	Centraal, Oost en Noord-Amerika		West-China en ingevoerd Verenigde Staten in 1909	Korea	
Bloeitijd				jun	
21					
Aantal		2			
Nederlandse naam	Krentenboompje				
Wetenschappelijke naam		Spiraea nipponica			
Familie naam		Rozen			
In Europa sinds		1870, Nederland			
Oorsprong		Japan			
Bloeitijd		mei jun			

22 Noordelijke buitenrand



wolfskers

22	1	2	3	4	5
Aantal	2	1	3	1	1
Nederlandse naam	Okkernoot				(Stermagnolia)
Wetenschappelijke naam	Juglans regia	Magnolia x soulangeana	Magnolia kobus	Magnolia x soulangeana (Alba Superba)	Magnolia stellata
Familie naam	Noot	Tulpenboom	Tulpenboom	Tulpenboom	Tulpenboom
In Europa sinds	lang in cultuur	1820, Frankrijk	Japan en ingevoerd	1867	Japan en ingevoerd
Oorsprong	Zuidoost-Europa en Centraal-Azië,	kruisingsprodukt	Verenigde Staten in 1865	Nederland	Verenigde Staten in 1862
Bloeitijd	apr mei	apr mei	apr mei	apr	apr

22 Noordelijke buitenrand

22	6	7	8	9	10
Aantal		1	1	1	1
Nederlandse naam		(Goudenregen)	(Goudenregen)	(Goudenregen)	Zwarte walnoot
Wetenschappelijke naam		Laburnum x watereri	Laburnum anagyroides	Laburnum alpinum	Juglans nigra
Familie naam		Vlinderbloem	Vlinderbloem	Vlinderbloem	Noot
In Europa sinds		1840	1560, Duitsland	1596, Engeland	1629, Engeland
Oorsprong		Engeland	Centraal en Zuid-Europa	Centraal en Zuid-Europa	Centraal en Oost-Verenigde Staten
Bloeitijd		jun	mei jun	jun	mei
22	11	12	13	14	15
Aantal	1	2	1	2	1
Nederlandse naam	(Indigostruik)	(Judasboom)		Wilde lijsterbes	Meelbes
Wetenschappelijke naam	Indigofera heterantha	Cercis siliquastrum	Sorbus intermedia	Sorbus aucuparia	Sorbus aria
Familie naam	Vlinderbloem	Vlinderbloem	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1840, Engeland	sinds Oudheid	lang in cultuur	lang in cultuur	lang in cultuur
Oorsprong	Himalaja	Mediterraan	Zuid-Scandinavië en Zuid-Oostzeekust	Europa tot Siberië	Europa
Bloeitijd	jul aug sep	apr mei	mei	mei	
22	16	20	21	22	23
Aantal	2	1	2	1	1
Nederlandse naam			Mispel	Althaeastruik	
Wetenschappelijke naam	Sorbus americana	Crataegus x prunifolia	Mespilus germanica	Hibiscus syriacus	Paulownia tomentosa
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Kaasjeskruid	Leeuwenbek
In Europa sinds	1809, Duitsland	1783, Duitsland	lang in cultuur	1596, Engeland	1834, Frankrijk
Oorsprong	Centraal, Oost en Noord-Amerika	kruisingsprodukt	West-Azië, in Europa verwilderd	China en India	China
Bloeitijd		mei	mei	jul aug sep	apr mei
22	24	25	26	27	28
Aantal	1	3	1	2	1
Nederlandse naam		Judasboom			Japanse bottelroos
Wetenschappelijke naam	Spiraea x vanhouttei	Cercis siliquastrum	Spiraea x billiardii	Spiraea trilobata	Rosa rugosa
Familie naam	Rozen	Vlinderbloem	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1862	sinds Oudheid	1854	1801, Engeland	1796, Engeland
Oorsprong	Frankrijk	Mediterraan	Frankrijk	Centraal-Azië en Noord-China	Oost-Azië
Bloeitijd	mei jun	apr mei	jul aug sep	mei jun	mei jun jul aug

22 Noordelijke buitenrand

22	29	30	31	32	33
Aantal	1		1	1	1
Nederlandse naam	Hondsroos		Honderbladige roos		
Wetenschappelijke naam	Rosa canina		Rosa centifolia	Rosa nitida	Corylopsis spicata
Familie naam	Rozen		Rozen	Rozen	Toverhazelaar
In Europa sinds	lang in cultuur		sinds Oudheid	1807, Engeland	1856, Nederland
Oorsprong	Europa en Mediterraan		Kaukasus	Oost-Canada en Japan	Noordoost-Verenigde Staten
Bloeitijd	jun jul		jun jul	jun jul	mrt apr
22	34	35	36	37	38
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam		Japanse toverhazelaar	Amerikaanse toverhazelaar		Amberboom
Wetenschappelijke naam	Corylopsis pauciflora	Hamamelis japonica	Hamamelis virginiana	Hamamelis mollis	Liquidamber styraciflua
Familie naam	Toverhazelaar	Toverhazelaar	Toverhazelaar	Toverhazelaar	Toverhazelaar
In Europa sinds	1860, Rusland	1859, Nederland	1737, Engeland	1879, Engeland	1640, Nederland
Oorsprong	Japan	Japan	Centraal en Oost-Verenigde Staten	Centraal-China	Centraal en Oost-Verenigde Staten en Mexico
Bloeitijd	mrt apr	jan feb mrt	sep okt	jan feb mrt december	apr mei
22	39	40			
Aantal	1	1	2		1
Nederlandse naam	Gewone acacia	Valse christusdoorn	Tweestijlige mei doorn	Vlier	
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia	Gleditsia triacanthos	Crataegus laevigata	Crataegus x grignonensis	
Familie naam	Vlinderbloem	Vlinderbloem	Rozen	Rozen	
In Europa sinds	1601, Frankrijk	1700, Engeland	lang in cultuur		1873, Frankrijk
Oorsprong	Centraal en Oost-Verenigde Staten	Centraal en Noordoost-Verenigde Staten	Europa en Noord-Afrika		kruisingsprodukt
Bloeitijd	jun	jun jul	apr mei		mei jun
22					
Aantal	1				
Nederlandse naam	Hanedoorn		Berk	Hazelaar	Krentenboompje
Wetenschappelijke naam	Crataegus crus,galli				Liguster
Familie naam	Rozen				
In Europa sinds	1691, Engeland				
Oorsprong	Oost-Canada en Noordoost-Verenigde Staten				
Bloeitijd	mei jun				

22 Noordelijke buitenrand

22

Aantal

Nederlandse naam [Lijsterbes](#) [Eenstijlige
Meidoorn](#)

**Wetenschappelijke
naam**

Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd

23 Noordelijke buitenrand



23	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	1	3
Nederlandse naam		Pluimes	Hondsroos	Franse roos	Duinroos/Schots e Roos
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica (Commelin)	Fraxinus ornus	Rosa canina	Rosa gallica	Rosa pimpinellifolia
Familie naam	Iepen	Olijf	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1950	lang in cultuur	lang in cultuur	sinds Oudheid	lang in cultuur
Oorsprong	Nederland	Zuid-Europa en West-Azië	Europa en Mediterraan	Centraal en West-Europa en West-Azië	Europa en Azië
Bloeitijd	feb mrt	mei jun	jun jul	jun jul	mei jun

23 Noordelijke buitenrand

23	6	7	8	9	10
Aantal	2	3	5	5	2
Nederlandse naam		Veelbloemige roos	Gele Roos		Honderbladige Roos
Wetenschappelijke naam	Rosa glauca	Rosa multiflora	Rosa foetida (Lutea)	Rosa nitida	Rosa centifolia
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen	Rozen
In Europa sinds	1818, Nederland	1804, Engeland	1594, Nederland	1807, Engeland	sinds Oudheid
Oorsprong	Centraal en Zuid-Europa	Japan en Korea	Zuidwest-Azië	Oost-Canada en Noordoost-Verenigde Staten	Kaukasus
Bloeitijd	jun jul	jun jul aug	jun	jun jul	jun jul
23	11	12	13	14	15
Aantal	5	5	1	1	1
Nederlandse naam		Eglantier	Amerikaans krenteboompje		Westerse plataan
Wetenschappelijke naam	Rosa x alba	Rosa rubiginosa	Amelanchier laevis	Kolkwitzia amabilis	Platanus occidentalis
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Kamperfoelie	Plataan
In Europa sinds	1597, Engeland	1594, Nederland	1781, Duitsland	1901, Engeland	1636, Engeland
Oorsprong	kruisingsprodukt	Europa	Oost en Noord-Amerika	China	Centraal en Oost-Verenigde Staten
Bloeitijd	jun	jun jul	apr mei	mei	
23	16	17	18	19	20
Aantal	1	1	2	1	1
Nederlandse naam	Kogelbloem				
Wetenschappelijke naam	Cephalanthus occidentalis	Lonicera xylosteum	Lonicera morrowii	Lonicera tatarica	Lonicera maackii
Familie naam	Walstro	Kamperfoelie	Kamperfoelie	Kamperfoelie	Kamperfoelie
In Europa sinds	1735, Engeland	lang in cultuur	1875, onbekend	1752, Engeland	1860, Rusland
Oorsprong	Noord Amerika	Europa, Mediterraan en Centraal-Azië	Japan	Zuid-Rusland	Mandshoerije en Korea
Bloeitijd	jul aug	mei jun	mei jun	mei jun	mei jun
23	21	22	23	24	25
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam					Sneeuwbes
Wetenschappelijke naam	Lonicera ledebourii	Weigela japonica	Weigela florida	Symphoricarpos orbiculatus	Symphoricarpos albus
Familie naam	Kamperfoelie	Kamperfoelie	Kamperfoelie	Kamperfoelie	Kamperfoelie
In Europa sinds	1838, Engeland	1892, onbekend	1844, Engeland	1730, Engeland	1817, Engeland
Oorsprong	Californië	Japan	Noord-China en Korea	Centraal en Oost-Verenigde Staten	Oost-Canada en Noord-Verenigde Staten
Bloeitijd	jun jul	mei jun	mei jun jul	jul aug sep	jun jul aug sep

23 Noordelijke buitenrand

23	26	27	28	29	30
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	Gewone plataan	Oosterse plataan	Wasgagel	Varenberk	
Wetenschappelijke naam	Platanus x acerifolia	Platanus orientalis	Myrica pensylvanica	Comptonia peregrina	Ceanothus x delileanus
Familie naam	Plataan	Plataan	Gagel	Gagel	Wegedoorn
In Europa sinds	1670, Engeland	1548, Engeland	1725, Engeland	1714, Engeland	1856, Nederland
Oorsprong	kruising P.occidentalis x P.orientalis	Azie (Orient)	Oost en Noord-Amerika	Oost-Canada en Noordoost-Verenigde Staten	kruisingsprodukt
Bloeitijd	mei	mei	apr mei	apr mei	jul aug
23	31	32	33	34	35
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam		Wilde liguster	Haagliguster		
Wetenschappelijke naam	Ligustrum obtusifolium	Ligustrum vulgare	Ligustrum ovalifolium	Ligustrum quihoui	Viburnum farreri
Familie naam	Olijf	Olijf	Olijf	Olijf	Kamperfoelie
In Europa sinds		lang in cultuur	1843, Nederland	1860, Frankrijk	1911, Engeland
Oorsprong	Japan	Europa en Mediterraan	Japan	China	Noord-China
Bloeitijd	jun jul	jun jul	jun jul	jul aug sep	feb mrt apr
23	36	37	38	39	40
Aantal	1	1	1	1	2
Nederlandse naam				Wollige sneeuwbal	
Wetenschappelijke naam	Viburnum x burkwoodii	Viburnum rhytidophyllum	Viburnum carlesii	Viburnum lantana	Celtis australis
Familie naam	Kamperfoelie	Kamperfoelie	Kamperfoelie	Kamperfoelie	Iepen
In Europa sinds	1924, Engeland	1900, Engeland	1885, Japan	1594, Nederland	1596, Engeland
Oorsprong	kruisingsprodukt	Centraal en West-China	Korea	Europa en Mediterraan	Mediterraan
Bloeitijd	apr mei	mei jun	mei jun		apr mei
23	41	42	A 9	A12	A14
Aantal	3	1	1	1	1
Nederlandse naam	Trosvlier	Balsempopulier			
Wetenschappelijke naam	Sambucus racemosa	Populus balsamifera	Symphoricarpos x chenaultii	Macrodiervilla middendorffiana	Weigela praecox
Familie naam	Kamperfoelie	Wilgen			
In Europa sinds	1596, Engeland	17de eeuw	1908	1850, Rusland	
Oorsprong	West-Azië	Noord-Amerika	Frankrijk	Oost-Azië	Korea, 1894
Bloeitijd	apr mei	apr			

23 Noordelijke buitenrand

23	A22	F 6	K10	K11	
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam				Japanse toverhazelaar	
Wetenschappelijke naam	Amelanchier canadensis	Spiraea trilobata	Corylopsis pauciflora	Hamamelis japonica	Corylopsis spicata
Familie naam	Rozen	Rozen	Toverhazelaar	Toverhazelaar	
In Europa sinds	1746, Engeland	1801, Engeland	1860, Rusland	1859, Nederland	1856, Nederland
Oorsprong	Noordoost en Noord-Amerika	Centraal-Azië en Noord-China	Japan	Japan	Japan
Bloeitijd					
23					
Aantal	1	1	1	1	
Nederlandse naam					
Wetenschappelijke naam	Rosa hugonis	Spiraea thunbergii	Spiraea trichocarpa	Hamamelis mollis	
Familie naam	Rozen	Rozen	Rozen	Toverhazelaar	
In Europa sinds	1899, Engeland	1859, Nederland	1920	1879, Engeland	
Oorsprong	West-China	China en Japan	Korea	Centraal-China	
Bloeitijd	mei jun			jan feb mrt december	

24 Veenplaat en veeneiland



koninginnekruid
moerasspirea
waterzuring
gele waterkers
riet
watermunt
wolfspoot
harig wilgenroosje
koninginnekruid
gele waterkers

gevlekte rietorchis, ongevlekte rietorchis, brede orchis keverorchis, kale jonker, ratelaar, veldzuring, knolsteenbreek, blauwe knoop, wederik

24	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	2	3
Nederlandse naam	boomhazelaar	lambertsnoot	gewone haagbeuk	geoorde wilg	boswilg of waterwilg
Wetenschappelijke naam	Corylus colurna	Corylus maxima	Carpinus betulus	Salix aurita	Salix caprea
Familie naam	Berken	Berken	Berken	Wilgen	Wilgen
In Europa sinds	1586, Oostenrijk	1759, Engeland	1759, Engeland	lang in cultuur	lang in cultuur
Oorsprong	Balkan	Zuidoost-Europa en West-Azië	Zuidoost-Europa en West-Azië	Europa en West-Azië	Europa en West-Azië
Bloeitijd	feb mrt	jan feb mrt	jan feb mrt	mrt apr	mrt apr
24	6	7	8		
Aantal	2	1	1		
Nederlandse naam		schietwilg	grijze wilg	wilg (geknot)	els (geknot)
Wetenschappelijke naam	Salix daphnoides	Salix alba	Salix elaeagnos		
Familie naam	Wilgen	Wilgen	Wilgen		
In Europa sinds	1796, Duitsland	lang in cultuur	1762, Frankrijk		
Oorsprong	Europa, Centraal-Azië en Himalaja	Europa, Noord-Azië en Mediterraan	Centraal en Zuid-Europa en Klein-Azië		
Bloeitijd	mrt apr	mei	apr mei		

25 Oever met akkerkruiden



korenbloem
 klaproos
 bolderik
 gele ganzebloem
 wilde klaproos of papaver,
 akkervergeetme-niet-je
 herik
 soorten wikke
 hennepnetel
 spiegelklokje

25	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	gewone hazelaar	eenstijlige mei doorn	zachte berk	ratelpopulier	grauwe abeel
Wetenschappelijke naam	Corylus avellana	Crateagus monogyna	Betula pubescens	Populus tremula	Populus x canescens
Familie naam	Berken	Rozen	Berken	Wilgen	Wilgen
In Europa sinds	sinds oudheid	lang in cultuur	lang in cultuur	lang in cultuur	lang in cultuur
Oorsprong	Europa en Midditerraan	Europa en Midditerraan	Europa en Noord-Amerika	Europa, Azië en Midditerraan	lang in cultuur
Bloeitijd	jan feb mrt	mei	apr mei	mrt apr	mrt apr

25		
Aantal		
Nederlandse naam	Krentenboompje	Bittere Wilg
Wetenschappelijke naam		
Familie naam		
In Europa sinds		
Oorsprong		
Bloeitijd		

26 Bloemenweide



26	1	2	3	4	5
Aantal	1	1	1	1	1
Nederlandse naam	Drents krentenboompje	Ruwe berk	Gewone gagel	Moerasvaren	Koningsvaren
Wetenschappelijke naam	Amelanchier lamarckii	Betula pendula	Myrica gale	Thelypteris palustris	Osmunda regalis
Familie naam	Rozen	Berken	Gagel	Moerasvaren	Linde
In Europa sinds	1781, Duitsland	lang in cultuur	1600, Nederland		
Oorsprong	Oost en Noord-Amerika	Europa en Klein-Azië	Noordelijk halfrond	inheems, veenmoeras, natte duinvalleien	inheems, laagveengebied, greppels in voedselarm bos
Bloeitijd	apr mei	apr	mrt apr		
26	6				
Aantal	5				
Nederlandse naam	Schietwilg				
Wetenschappelijke naam	Salix alba (Liempde)				
Familie naam	Wilgen				
In Europa sinds	1890 , Nederland				
Oorsprong	knotwilg				
Bloeitijd	mei				

27



bostulp
 kerspruim
 roodborst
 winterkoning
 boomkruiper
 atalanta
 kleine vos
 landkaartje
 dagpauwoog

27

1

2

3

4

5

Aantal

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Familie naam

In Europa sinds

Oorsprong

Bloeitijd